

新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 預防登革熱

**落實居家整潔**

**巡**

經常巡檢

**倒**

清除積水

**刷**

刷洗容器

**清**

容器減量

**使用防蚊液**



含DEET(待乙妥)  
衛福部核准產品

**裝設紗門窗**



**穿著淺色長袖衣褲**



新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 認識登革熱

**病原體**

**登革病毒**

Dengue virus(黃熱病毒科/屬)  
分為I、II、III、IV四種型別  
在臺灣皆流行過

**傳染途徑**

藉帶病毒病媒蚊叮咬而感染  
不會人傳人

**病媒**

**埃及斑蚊(室內)**  
背部兩條彎曲白線  
嘉義以南各縣市

**白線斑蚊(戶外)**  
背部一條白色縱紋  
全島皆有分佈

新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 常見孳生源



瓶瓶罐罐



馬桶水箱



屋頂天溝



水桶



花瓶



輪胎



保麗龍



冰箱底盤



洗衣槽



飲水機底盤

清除病媒蚊孳生源遠離登革熱!

新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 登革熱的症狀

**一般症狀**

發燒  
後眼窩痛  
出疹  
關節痛

**警示症狀**

頭痛  
肌肉痛  
嗜睡  
持續嘔吐  
肝臟腫大  
胸水腹水

民眾如有以上症狀務必及早就醫!

新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 登革熱的處置

**在家休養**

休養至少一週  
遵醫囑  
多休息、多喝水

**做好防蚊措施**

使用蚊帳  
防蚊液  
著長袖衣褲

**不要趴臥走**

居家隔離  
至少一週  
避免散佈

**無特效藥物**



**無疫苗使用**



得病後勿恐慌,妥善治療會在1~2週後恢復!

新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 化學防治作為

**噴藥目的**

藉由環保署核准用藥  
殺死帶病毒病媒蚊  
防止疫情擴散

**噴藥原則**

確診病例周圍50公尺  
戶內外皆要執行  
視疫情及現場狀況  
調整噴藥範圍

注意事項

**噴藥前**

門窗緊閉  
食物收妥  
寵物帶開  
走道淨空  
不用養生膠帶

**噴藥後**

戶內密閉30至60分鐘  
通風半小時再進入  
注意地板濕滑  
身體不適儘速就醫

新北市政府衛生局  
Department of Health, New Taipei City Government

## 請民眾務必配合 各項防疫措施!

拒絕配合	查獲子子	擅闖管制區	拒絕噴藥
傳染病防治法 第36條	傳染病防治法 第25條	傳染病防治法 第37條	傳染病防治法 第38條
<b>罰鍰</b>	<b>罰鍰</b>	<b>罰鍰</b>	<b>罰鍰</b>
新台幣 3千至 1萬5千元	新台幣 3千至 1萬5千元	新台幣 6萬至 30萬元	新台幣 6萬至 30萬元

廣告

